

RAPORT
PRIVIND UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR DE REZERVĂ
LA NIVELUL ANULUI 2018

În conformitate cu OMS 1101/2016, Anexa nr. 1, Cap. II, 2, (g)

Nr Crt	Denumire antibiotic	Intrari	Consum (flacoane)					Total
			Sectia Medicina Interna	Sectia Pediatrie	Compartiment Chirurgie Generala	Compartiment ATI		
1	Colistina	200	33	36	3	114	186	
2	Imipenem-cilastatin	210	0	0	32	161	193	
3	Vancomicina	360	0	0	190	97	287	
4	Meropenem	250	0	0	71	174	245	
5	Targocid	40	0	0	0	20	20	

Utilizarea acestora a vizat următoarele considerente:

- ✓ **Pediatrie:** a fost folosita Colistina pentru **3 pacienti** cu fibroza chistica si **1 pacient** cu pneumonie cu clebsiela conform antibiogramei.
- ✓ **Medicina Interna :** a fost folosita Colistina pentru **1 pacient** cu infectie urinara cu escherichia coli sensibil la colistin.
- ✓ **Chirurgie generala:** antibioticele au fost folosite dupa cum urmeaza:

Vancomicina—15 pacienti (10 pacienti cu dz cu angiopatie periferica si gangrena, 2 pacienti cu colecistita acuta litiazica cu angiocolita, 1 pacient cu neoplasm bronhopulmonar stadiu metastatic, infectie cu cl. diff., 1 pacient cu traumatism toracic sever cu plaga taiata (la pacient diabetic) si 1 pacient cu embolie si tromboza periferica cu gangrena membrul pelvin).

Imipenem/cilastatin—3 pacienti (1 pacient neoplasm colon drept, 1 pacient colecistita acuta litiazica cu angiocolita, 1 pacient dz cu angiopatie si gangrena).

Colistina—1 pacient peritonita acuta

Meropenem—6 pacienti (2 pacienti colecistita acuta litiazica cu angiocolita, 2 pacienti dz cu angiopatie si gangrena, 1 pacient cu eventratie incarcerata si ocluzie si 1 pacient cu aderente peritoneale si ocluzie).

✓ **A.T.I.** antibioticele au fost folosite dupa cum urmeaza:

Vancomicina—12 pacienti (3 pacienti cu diabet zaharat cu angiopatie periferica si gangrena, 6 pacienti cu sepsis, (din care 1 cu punct de plecare pulmonar si 5 pacienti cu punct de plecare abdominal din care 4 pacienti neoplazici), 1 pacient cu neoplasm bronhopulmonar stadiu metastatic, infectie cu cl diff, 1 pacient cu embolie si tromboza periferica cu gangrena membrul pelvin, 1 pacient cu traumatism sever plaga taiata, la un pacient cu diabet.

Imipenem/cilastatin—11 pacienti (2 pacienti neoplasm colon, 1 pacient neoplasm trahee, 2 pacienti cu sepsis cu punct de plecare pulmonar, 4 pacienti cu colecistita acuta litiazica cu angiocolita, 2 pacienti cu diabet zaharat cu angiopatie si gangrena)

Colistina—6 pacienti (1 pacient cu peritonita acuta, 2 pacienti neoplasm colon, 2 pacienti cu sepsis, (unul cu punct de plecare pulmonar si unul cu punct de plecare abdominal), 1 pacient diabet zaharat cu angiopatie si gangrena)

Meropenem—13 pacienti (4 pacienti cu colecistita acuta litiazica cu angiocolita, 2 pacienti cu diabet zaharat cu angiopatie si gangrena, 2 pacienti cu sepsis cu punct de plecare abdominal, 2 pacienti cu neoplasm colon, 1 pacient cu embolie si tromboza periferica cu gangrena membrul pelvin, 1 pacient cu neoplasm hepatic, 1 pacient cu mediastinita)

Targocid—1 pacient cu peritonita si sepsis cu punct de plecare abdominal.

**Dr. Frunza Camelia – Responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor
CPCIN – Spital orășenesc Sinaia**